



**INFORME DE RESULTADOS**  
ENPCSP-2008 CIUDAD DE BUENOS AIRES

2 / 12 / 09

# Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008. Ciudad de Buenos Aires

## Presentación

A continuación se presentan resultados de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 para la Ciudad de Buenos Aires. Este relevamiento, tiene como antecedentes inmediatos la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y el Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004. Su principal objetivo es obtener información para el diseño e implementación de políticas públicas de prevención en el campo de la salud, la educación y el trabajo.

La Encuesta se realizó en el marco de un trabajo conjunto entre el INDEC y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la asistencia del Comité Científico Asesor y el Ministerio de Salud de la Nación. También participaron activamente las Direcciones de Estadística en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

La población objetivo de la encuesta comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en viviendas particulares ubicadas en poblaciones urbanas de 5.000 y más habitantes.

En la encuesta se relevó información básica sobre las personas y sus hogares de modo de permitir una caracterización de aquellos individuos identificados como consumidores (sexo, edad, nivel de instrucción, ingresos, condición de actividad y categoría ocupacional). Se indagó sobre el consumo de sustancias psicoactivas sociales (bebidas alcohólicas y tabaco), fármacos (estimulantes, sedantes y anoréxicos) y sustancias psicoactivas ilegales (marihuana, cocaína, pasta base, crack, opiáceos y anestésicos, éxtasis, alucinógenos e inhalables). Para cada uno se generaron indicadores sobre prevalencias de consumo de vida, del último año y del último mes, edad de inicio, percepción de riesgo y demanda de tratamiento.

En este informe se presentan los resultados obtenidos para la Ciudad de Buenos Aires en relación con el consumo de las cinco sustancias de mayor prevalencia: alcohol, tabaco, tranquilizantes, marihuana y cocaína. Se caracterizarán, en este caso, a las personas que declararon su consumo reciente (prevalencia de 1 año) según sexo y grupos de edad, nivel de instrucción alcanzado y condición de actividad. Así mismo se realizará un análisis de riesgo para el consumo excesivo de alcohol.

Se considera prevalencia reciente (1 año) a la proporción de personas de 16 a 65 años que consumió alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en el último año respecto del total de personas del mismo grupo de edad. En el caso de los tranquilizantes, se considera al consumo que se realizó sin indicación médica y/o en mayor cantidad y/o por más tiempo de lo indicado por un/a médico/a. Se considera prevalencia de vida a la proporción de personas de 16 a 65 años que consumió alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida respecto del total de personas del mismo grupo de edad. Finalmente, se considera prevalencia actual (1 mes) a la proporción de personas de 16 a 65 años que consumió alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en el último mes respecto del total de personas del mismo grupo de edad.

En el Anexo se incluyen cuadros y gráficos sobre prevalencia de acceso, percepción de riesgo y abuso de bebidas alcohólicas. Al final del informe se incluye un glosario con los términos utilizados.

## Resultados

En primer lugar, es necesario señalar que en la Ciudad las prevalencias de consumo reciente (1 año) para todas las sustancias son superiores a las del total de país y a las del resto de las jurisdicciones<sup>1</sup> (Cuadro 1), presentándose las diferencias más

<sup>1</sup> Resultados presentados en el Taller regional "La producción estadística y la formulación de políticas públicas. Presentación de los resultados de la ENPreCoSP-2008". Ciudad de Buenos Aires. Abril 2009

## C1 | Prevalencia del último año de consumo de sustancia psicoactiva por sustancia según jurisdicción seleccionada. Año 2008

Jurisdicción	Sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
Total país	67,0	34,3	1,5	1,5	0,5
Ciudad de Buenos Aires	83,0	35,8	3,6	6,0	1,2
Gran Buenos Aires	68,6	34,4	1,7	2,0	0,7
Buenos Aires	66,2	33,8	1,2	0,9	0,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

notorias para las sustancias ilegales (marihuana y cocaína).

Tal como se mencionó anteriormente, esta diferencia se mantiene para todas las sustancias, pero se

hace más significativa en las sustancias ilegales y en los tranquilizantes sin indicación médica: mientras la prevalencia de consumo de marihuana para el total del país es del 1,5%, para la Ciudad este porcentaje alcanza el 6,0%. En el caso del consumo

## C2 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes por sustancia psicoactiva. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Sustancia psicoactiva	Prevalencia		
	Vida	Último año	Último mes
Bebidas alcohólicas	92,5	83,0	63,5
Tabaco	61,9	35,8	31,2
Tranquilizantes	8,1	3,6	1,7
Marihuana	19,3	6,0	3,1
Cocaína	5,0	1,2	0,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

de cocaína y de los tranquilizantes, el valor de la Ciudad (1,2% y 3,6%, respectivamente) duplica al del total país.

Cuando se analizan las prevalencias del último año de consumo de sustancias para la población de la Ciudad, se observa una prevalencia significativamente superior en las bebidas alcohólicas y el tabaco que en las drogas ilegales, independientemente del sexo o el grupo de edad.

Efectivamente, el 83,0% de la población encuestada declaró haber consumido alcohol al menos una vez en el año y el 35,8%, tabaco. En las sustancias ilegales, las prevalencias de consumo reciente son del 6,0% para la marihuana, 3,6% para los tranquilizantes sin indicación médica y 1,2% para la cocaína.

El consumo es diferencial por sexo, presentando los varones los porcentajes más elevados, con excepción del consumo de tranquilizantes donde la prevalencia es mayor entre las mujeres (4,3% para ellas y 2,8% para ellos).

Al analizar las prevalencias de consumo reciente por grupo de edad, se observa que las diferencias más significativas se observan en el consumo de sustancias ilegales. En efecto, la marihuana es la droga de mayor uso, principalmente entre la población joven (hasta 34 años). En este grupo etario el promedio del consumo reciente casi duplica al del total de la Ciudad.

Indicador sociodemográfico	Sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>83,0</b>	<b>35,8</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Sexo</b>					
Varón	86,4	37,4	2,8	6,3	1,4
Mujer	80,1	34,4	4,3	5,7	1,1
<b>Grupo de edad (años)</b>					
16-24	86,2	40,7	5,1	11,9	3,1
25-34	82,0	38,2	3,4	10,9	1,1
35-49	85,7	37,0	4,0	2,9	0,7
50-65	79,2	29,2	2,4	0,3	0,4
<b>Máximo nivel de instrucción alcanzado</b>					
Hasta primaria completo	67,4	40,6	7,4	4,8	4,8
Secundario incompleto	80,6	37,2	2,4	6,2	2,2
Secundario completo	87,1	39,1	3,0	4,4	0,2
Terciario/Universitario incompleto y más	85,2	33,3	3,5	6,7	0,6
<b>Condición de actividad</b>					
Ocupado	84,1	36,4	4,2	5,1	1,1
Desocupado	84,0	56,9	11,8	26,0	1,8
Inactivo	78,9	29,1	-	5,1	1,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

En cuanto a las sustancias legales, es de destacar que el consumo de tabaco es mayor entre los más jóvenes (16 a 24 años) y disminuye a medida que aumenta la edad. Esta tendencia es similar a la del consumo de alcohol.

Con respecto al nivel de instrucción alcanzado, se puede señalar lo siguiente: entre los que tienen primaria completa se observan las mayores prevalencias de consumo de tabaco (40,6%), tranquilizantes (7,4%) y cocaína (4,8%). Para los que alcanzaron secundaria completa se destaca la mayor prevalencia en consumo de alcohol (87,1%) y entre los que tienen el máximo nivel de instrucción, el consumo de marihuana. En cuanto a la condición de actividad, las prevalencias de sustancias psicoactivas más importantes se dan entre los desocupados,

destacándose el consumo de tabaco, tranquilizantes y marihuana.

Ahora bien, al tener en cuenta el tipo de hogar en el que residen los consumidores de sustancias psicoactivas podemos destacar, en primer lugar, que aquellos que viven en hogares multipersonales no conyugales<sup>3</sup> son los que presentan mayor prevalencia de consumo reciente de alcohol, alcanzando un valor de 94,0%. En los hogares nucleares incompletos<sup>4</sup> se destaca, asimismo, el consumo de tabaco. Por último, cabe señalar que la mayor prevalencia de consumo de tranquilizantes, marihuana y cocaína tiene lugar entre quienes viven en hogares no nucleares incompletos<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Hogar multipersonal no conyugal: hay un jefe y hay al menos un miembro pariente o no pariente.

<sup>4</sup> Hogar nuclear incompleto: hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).

<sup>5</sup> Hogar no nuclear incompleto: hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes)

## C4 | Prevalencias del último año de consumo de sustancia psicoactiva por sustancia según tipo de hogar e ingresos del hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Características del hogar	Sustancia psicoactiva				
	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Tipo de hogar</b>					
Unipersonal	82,6	38,9	0,6	10,2	0,8
Nuclear completo	84,1	33,0	3,5	4,5	0,9
No nuclear completo	68,8	33,2	4,4	4,5	-
Nuclear incompleto	85,5	45,1	2,6	5,0	1,7
No nuclear incompleto	68,6	35,0	14,4	13,3	6,2
Multipersonal no conyugal	94,0	40,6	1,6	9,6	0,8
<b>Ingresos del hogar</b>					
Hasta 900	72,2	28,2	4,1	7,3	0,6
901-2000	79,1	39,2	3,2	6,0	2,1
2001-7500	84,6	35,7	2,2	5,2	0,4
7501 y más	93,4	35,6	5,9	10,6	2,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

Por otro lado, en los hogares con mayores ingresos<sup>6</sup> se observan mayores niveles de prevalencia en consumo de alcohol, tranquilizantes, marihuana y cocaína. En los hogares que tienen ingresos entre 901-2000 es mayor el consumo de tabaco y cocaína. El porcentaje de prevalencia de esta última sustancia es igual al grupo de mayores ingresos.

Para finalizar, respecto a la edad promedio de inicio al

consumo<sup>7</sup> de las diversas sustancias es de destacar que en el caso del tabaco se presentan tanto para varones como para mujeres los valores más bajos, entre 17 y 18 años de edad. Para ambas sustancias, los varones comienzan en edades más tempranas que las mujeres. En el otro extremo, quienes consumen tranquilizantes declaran haber comenzado a consumir alrededor de los 28 años y son las mujeres las que se inician en edades más tempranas.

## C5 | Edad promedio de inicio al consumo reciente de sustancia psicoactiva por sustancia según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Sexo	Sustancia psicoactiva				
	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
Total	18	17	28	19	21
Varón	17	16	30	19	22
Mujer	18	17	27	20	19

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

Para la marihuana y la cocaína, el promedio de edad de inicio se ubica entre los 19 y los 21 años. Pero mientras en el primer caso, los varones declaran edades más tempranas que las mujeres, en el segundo, esta situación se invierte.

### Estimación de riesgo del consumo excesivo de alcohol por grupo de edad y sexo

Se considera que existe consumo episódico excesivo cuando "el encuestado ha consumido 5 o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días de los respectivos tipos de bebidas (cerveza, vino, bebidas fuertes) entre semana o en el fin de semana" (INDEC,

<sup>6</sup> La base usuarios de la ENPreCoSP presenta, para esta variable, tramos de ingresos predefinidos por lo que resultó imposible elaborar el ingreso per cápita familiar. Se optó, por ello reagrupar los tramos de ingresos y tomar el Ingreso total mensual familiar, aun sabiendo que este indicador está influido por el tamaño del hogar y la cantidad de perceptores de ingresos.

<sup>7</sup> La edad de inicio en el consumo de drogas es un indicador de relevancia para proyectar cuan problemático puede llegar a ser el uso de sustancias en el futuro.

2009, p. 65). Para el análisis de riesgo que se realiza aquí, la población queda acotada a los encuestados que hayan consumido alcohol en el último mes, denominados “consumidores actuales”. Este indicador de “consumo episódico excesivo se construyó de acuerdo con los criterios sugeridos por el CDC<sup>8</sup>, la OPS y otros” (INDEC, 2009, p. 65).

Para comparar la asociación entre los grupos de edad y el sexo, se aplicó Odds Ratio (Odds) con su intervalo de confianza al 95% (ic95%) y la Razón de Prevalencia (RP) con su IC95%. El Odds también se denomina Razón de proporciones, Razón de ventajas o Razón de productos cruzados, dado que es la razón del producto de las celdas diagonales de una tabla de doble entrada de 2x2 filas y columnas. La Razón

de Prevalencia, por su parte, es la relación entre la prevalencia de los expuestos sobre los no expuestos, siendo el indicador más parecido al Riesgo relativo.

Estos estadísticos muestran la intensidad de la asociación entre las categorías de las variables a comparar, siendo la hipótesis planteada que los varones y los menores de 30 años, están más expuestos al consumo episódico excesivo de alcohol.

Cuando Odds y RP tiene valores iguales a 1 o el ic95% incluye al 1, indica que no hay relación (asociación) entre los expuestos y no expuestos. Cuando son diferentes de 1 y el ic95% no lo incluye, indica que hay relación entre los expuestos y no expuestos.

## C6

### Distribución porcentual de los consumidores actuales de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Grupo de edad (años)	Total	Consumo excesivo	
		Si	No
Total	100,0	14,3	85,7
16 - 29	100,0	23,1	76,9
30 - 65	100,0	9,6	90,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## C7

### Estimación de riesgo entre grupo de edad. Relación entre: menores de 30 años / mayores de 30 años. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Consumo episódico excesivo	Valor	IC95%
Odds ratio	2,82	1,84 – 4,34
Razón de prevalencia	2,40	1,67 – 3,45

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## C8

### Distribución porcentual de los consumidores actuales de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Sexo	Total	Consumo excesivo	
		Si	No
Total	100,0	14,3	85,7
Varón	100,0	21,7	78,3
Mujer	100,0	6,1	93,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

Se observa en el cuadro 7, que los menores de 30 años tienen casi 3 veces más riesgo de realizar “consumo episódico excesivo” que los mayores de 30 años. En caso del riesgo según el sexo (cuadro 9), se observa que los varones tienen 4 veces más probabilidades de “consumo episódico excesivo” que las mujeres.

Los resultados obtenidos muestran marcadas diferencias en el patrón de consumo de alcohol para los factores grupo de edad y sexo. La prevalencia en consumo episódico excesivo en jóvenes varones menores de 30 años fue del 31,5% y en las mujeres de 13,7%, llegando a menos del 2% en mujeres mayores de 29 años.

<sup>8</sup> Centers for Disease Control and Prevention. Indicators for chronic disease surveillance. MMWR 2004.

## C9 | Estimación de riesgo entre Sexo. Relación entre: Varón / Mujer. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Consumo episódico excesivo	Valor	IC95%
Odds ratio	4,28	2,56 – 7,17
Razón de prevalencia	3,57	2,24 – 5,70

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## C10 | Distribución porcentual de los consumidores actuales de alcohol por condición de consumo episódico excesivo según sexo y grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Sexo y grupos de edad (años)	Total	Consumo excesivo	
		Si	No
Total	100,0	14,3	85,7
Total varón	100,0	21,7	78,3
16 - 29	100,0	31,5	68,5
30 - 65	100,0	16,4	83,6
Total mujer	100,0	6,1	93,9
16 - 29	100,0	13,7	86,3
30 - 65	100,0	1,9	98,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## Bibliografía


6

INDEC (2009). "Documento para la utilización de la base de datos usuario". Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008.

# ANEXO: Cuadros y Gráficos


## 1. Prevalencia:

**G1.1** | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de alcohol y tabaco.  
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

**G2.1** | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de tranquilizantes, marihuana y cocaína.  
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.



## C1.1 | Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas por sustancia según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Grupo de edad (años)	Sustancia psicoactiva				
	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>92,5</b>	<b>62,0</b>	<b>8,1</b>	<b>19,3</b>	<b>5,0</b>
16-24	86,2	40,7	5,1	11,9	3,1
25-34	82,0	38,2	3,4	10,9	1,1
35-49	85,7	37,0	4,0	2,9	0,7
50-65	79,2	29,2	2,4	0,3	0,4
<b>Varón</b>	<b>94,1</b>	<b>67,2</b>	<b>6,1</b>	<b>23,7</b>	<b>7,5</b>
16-24	90,6	56,3	3,7	24,1	2,4
25-34	95,3	64,8	5,9	42,2	14,7
35-49	96,4	66,5	9,4	21,5	9,1
50-65	93,9	78,7	5,1	8,9	3,8
<b>Mujer</b>	<b>91,1</b>	<b>57,6</b>	<b>9,8</b>	<b>15,5</b>	<b>2,9</b>
16-24	94,1	62,0	14,5	25,5	7,7
25-34	90,4	51,8	9,6	19,3	1,7
35-49	90,9	58,0	10,9	16,9	2,8
50-65	90,0	58,7	6,0	4,7	0,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

8

## C1.2 | Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas por sustancia según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Grupo de edad (años)	Sustancia psicoactiva				
	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>83,0</b>	<b>35,8</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>1,2</b>
16-24	86,2	40,7	5,1	11,9	3,1
25-34	82,0	38,2	3,4	10,9	1,1
35-49	85,7	37,0	4,0	2,9	0,7
50-65	79,2	29,2	2,4	0,3	0,4
<b>Varón</b>	<b>86,4</b>	<b>37,4</b>	<b>2,8</b>	<b>6,3</b>	<b>1,4</b>
16-24	83,9	35,3	3,2	10,3	2,0
25-34	88,6	47,6	1,8	12,4	2,2
35-49	87,0	41,7	4,4	3,0	0,7
50-65	85,9	26,4	1,9	0,6	0,8
<b>Mujer</b>	<b>80,1</b>	<b>34,4</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>1,1</b>
16-24	88,4	45,8	7,0	13,4	4,2
25-34	75,9	29,5	4,8	9,5	-
35-49	84,7	33,3	3,7	2,8	0,8
50-65	74,0	31,5	2,7	0,2	-

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


## C1.3 | Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas por sustancia según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Grupo de edad (años)	Sustancia psicoactiva				
	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaina
<b>Total</b>	<b>63,5</b>	<b>31,2</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,1</b>
16-24	63,5	31,3	1,7	5,4	0,5
25-34	60,9	34,5	0,7	6,4	0,2
35-49	64,2	33,3	2,3	1,8	-
50-65	64,9	26,6	1,9	-	-
<b>Varón</b>	<b>73,5</b>	<b>32,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2,7</b>	<b>0,1</b>
16-24	66,6	26,1	0,0	2,3	-
25-34	74,7	43,3	0,0	6,7	0,3
35-49	72,7	38,2	2,1	2,0	-
50-65	78,8	22,2	1,3	-	-
<b>Mujer</b>	<b>55,0</b>	<b>30,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>
16-24	60,7	36,1	3,3	8,3	0,9
25-34	48,3	26,4	1,3	6,1	-
35-49	57,6	29,5	2,5	1,6	-
50-65	54,0	30,1	2,3	-	-

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


## G1.3 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de tabaco por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

9



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


## G1.4 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de alcohol por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


10

## G1.5 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de marihuana por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008




Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.6 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes de marihuana por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.7 | Prevalencia de consumo de vida, año y mes para cocaína por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## C1.4 | Prevalencia de consumo del último año por sustancia según grupo de edad y condición de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008


Grupo de edad (años) y condición de actividad	Sustancia psicoactiva				
	Tabaco	Alcohol	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Total</b>	<b>35,8</b>	<b>83,0</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>1,2</b>
<b>16-24</b>	<b>40,7</b>	<b>86,2</b>	<b>5,1</b>	<b>11,9</b>	<b>3,1</b>
Ocupado	47,7	85,8	7,2	7,7	3,8
Desocupado	48,7	100,0	27,5	50,0	-
Inactivo	33,0	84,7	-	10,3	3,0
<b>25-34</b>	<b>38,2</b>	<b>82,0</b>	<b>3,4</b>	<b>10,9</b>	<b>1,1</b>
Ocupado	40,3	83,3	3,9	11,0	1,2
Desocupado	50,3	79,0	-	26,5	-
Inactivo	8,4	69,5	-	-	-
<b>35-49</b>	<b>37,0</b>	<b>85,7</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>
Ocupado	36,3	85,5	4,5	2,9	0,5
Desocupado	83,3	80,0	-	8,7	8,7
Inactivo	22,1	91,0	-	-	-
<b>50-65</b>	<b>29,2</b>	<b>79,2</b>	<b>2,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
Ocupado	27,9	82,7	2,7	0,5	0,5
Desocupado	52,1	65,6	12,2	-	-
Inactivo	30,8	69,5	-	-	-

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

12


## 2. Facilidad de acceso:

### G1.8 | Acceso al consumo de tranquilizantes, marihuana y cocaína por posibilidad de acceso. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.9 | Acceso al consumo de tranquilizantes, marihuana y cocaína por posibilidad de acceso según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

### 3. Percepción de riesgo

#### 3.1 Total de la población encuestada:


## C1.5 | Percepción de riesgo de consumo de sustancia psicoactiva por frecuencia de consumo según sustancia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Frecuencia de consumo y tipo de riesgo	Sustancia psicoactiva				
	Tabaco	Alcohol	Tranquilizantes	Marihuana	Cocaína
<b>Consumo esporádico</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Ninguno	5,9	28,0	6,6	15,7	1,4
Leve o moderado	46,1	49,2	34,1	33,2	13,6
Grande	44,4	18,4	48,4	43,1	80,3
No se	3,7	4,4	10,9	8,0	4,7
<b>Consumo frecuente</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Ninguno	0,5	1,4	1,0	3,7	0,5
Leve o moderado	3,7	10,8	5,0	12,8	0,6
Grande	94,4	84,2	85,3	76,3	95,3
No se	1,5	3,6	8,6	7,2	3,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


### 3.2 Percepción de riesgo alto para el total de población

#### G1.10 | Percepción de riesgo alto por consumo esporádico de sustancias psicoactivas según condición de consumo reciente. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


#### G1.11 | Percepción de riesgo alto por consumo frecuente de sustancias psicoactivas según condición de consumo reciente. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.


### 3.3 Percepción de riesgo alto entre consumidores

## G1.12 | Percepción de riesgo alto por consumo esporádico de sustancias psicoactivas según frecuencia de consumo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.13 | Percepción de riesgo alto por consumo frecuente de sustancias psicoactivas según frecuencia de consumo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008




Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.



## G1.14


Percepción de riesgo alto por consumo esporádico de sustancias psicoactivas según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.15


Percepción de riesgo alto por consumo frecuente de sustancias psicoactivas según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.16

Percepción de riesgo por consumo de marihuana en forma esporádica por condición de consumo en el último año. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008




Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## G1.17

Percepción de riesgo por consumo de marihuana en forma frecuente por condición de consumo en el último año. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008


17



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

#### 4. Abuso de bebidas alcohólicas:


### G1.18 | Distribución porcentual de consumidores actuales (30 días) de alcohol por sexo según tipo de consumo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

18

### G1.19 | Percepción de riesgo por consumo de marihuana en forma frecuente por condición de consumo en el último año. Ciudad de Buenos Aires. Año 2008



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. ENPreCoSP 2008.

## Glosario

### Tipo de hogar:

*Unipersonal:* hay sólo un jefe y ningún otro miembro.

*Nuclear completo:* hay un jefe y al menos un hijo, con la presencia del cónyuge. No hay otros miembros (parientes o no parientes).

*No nuclear completo:* hay un jefe y al menos un hijo, con la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).

*Nuclear incompleto:* hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).

*No nuclear incompleto:* hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).

*Multipersonal no conyugal:* hay un jefe y hay al menos un miembro pariente o no pariente.

### Prevalencias:

*Prevalencia de vida:* proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas.

*Prevalencia del último año:* proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas.

*Prevalencia del último mes:* proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas.

**Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas:** resulta de que el encuestado haya consumido 5 o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días de los respectivos tipos de bebidas entre semana o en el fin de semana.

**Abuso de bebidas alcohólicas:** si se ha registrado abuso entre semana o abuso en fin de semana, se considera que existe abuso total y combinado de bebidas alcohólicas.

### Condición de actividad:

*Ocupados:* conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población.

*Desocupados:* se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.

*Inactivos:* conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.

**Ingreso del hogar:** esta calculado como el ingreso total mensual del hogar en pesos.

## Bibliografía

INDEC (2009). "Documento para la utilización de la base de datos usuario". Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008.