

**MORTALIDAD MATERNA SEGUN CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS
Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2003**

GRUPO DE CAUSAS Y CODIGOS CIE 10 REVISION	TOTAL	GRUPOS DE EDAD								TASA MORTALIDAD MATERNA
		10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más	
TODAS LAS CAUSAS	304	1	34	50	69	67	56	23	4	4,4
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	83	0	7	16	21	23	14	2	0	1,2
Causas obstétricas directas	187	1	25	26	35	40	39	17	4	2,7
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16)	46	0	8	11	7	8	7	4	1	0,7
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	20	0	0	1	6	5	7	1	0	0,3
Hemorragia postparto (O72)	37	0	2	2	6	11	10	4	2	0,5
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionados con el puerperio (O85-O92)	42	0	13	4	11	4	5	4	1	0,6
Otras causas directas(O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95 Y O97)	42	1	2	8	5	12	10	4	0	0,6
Causas obstétricas indirectas (O98-O99)	34	0	2	8	13	4	3	4	0	0,5

Nota: En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas de Salud (CIE-10) se incorporó una nueva categoría "muerte materna tardía" (O96 Y O97),entendiendo por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo".

A partir de este concepto, en el año 2003 se han identificado 18 muertes maternas tardías.