

**Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires**

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION

estadísticas

DEMOGRAFIA

Dirección de Estadística y Censos

SERIE METODOLOGICA
Nº 6 - MAYO 1990



Responsable de la elaboración:

Lic. Victoria Mazzeo

DIRECCION GENERAL ESTADISTICA CENSOS - BIBLIOTECA -	
SECCION	Básica
SIG. LIBRISTICA	600 3
VOLUMEN	
N° INVENTARIO	30383

INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Carlos A. Grosso

SECRETARIO DE PLANEAMIENTO

Arq. Alfredo Garay

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION

Dr. Jorge Argüello

DIRECTOR DE ESTADISTICA Y CENSOS

Est. Norberto V. Rodríguez

DIRECTOR ADJUNTO DE ESTADISTICA Y CENSOS

Sr. Pascual J. Argento

SISTEMA ESTADISTICO MUNICIPAL

DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS

Av. San Juan 1340 - T.E. 27-1572

C.P. 1148 - Capital Federal

DIRECCION DE ESTADISTICAS y CENSOS
BIBLIOTECA

PRESENTACION

Los registros de los hechos vitales de la población proporcionan datos estadísticos básicos para la planificación y para la ejecución y evaluación de las políticas de población, de allí la importancia de su difusión.

El presente boletín, cuya aparición ha sido dilatada por dificultades técnicas de variada índole, continúa la serie iniciada con el número 1 de agosto de 1987, siendo el propósito de esta Dirección mantener la difusión de las estadísticas vitales con un adecuado nivel de actualización.

Se presenta la información de nacimientos, matrimonios y defunciones correspondientes al período 1984-87 así como también la actualización de la serie histórica que se inicia en el año 1970, momento a partir del cual se comienzan a publicar las estadísticas correspondientes a residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

INDICE

Análisis de los datos	1
Población	7
Natalidad	15
Nupcialidad	27
Mortalidad	31
- General	35
- Infantil	47
- Fetal	59
Notas Aclaratorias	65
Anexos	
- Definiciones operativas y fórmulas utilizadas	69
- Lista básica de causas de mortalidad (9° revisión)	74
- Agrupación causas de muerte de menores de un año según criterios de evitabilidad ..	81

INDICE DE GRAFICOS

1 - Estructura por edad y sexo de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Año 1987	13
2 - Tasas de fecundidad por edad de madres residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Período 1970-87	23
3 - Participación relativa de los nacimientos de primer orden según edad de la madre. Promedio del período 1984-87	26
4 - Tasa de nupcialidad de las mujeres en edades fértiles (por mil). Período 1973-86	30
5 - Evolución de la mortalidad general, infantil y fetal en la Ciudad de Buenos Aires. Tasas por mil Período 1970-87	34
6 - Tasa de mortalidad según edad y sexo (por mil) Año 1984	39
7 - Tasa de mortalidad según edad y sexo (por mil) Año 1985	40
8 - Tasa de mortalidad según edad y sexo (por mil) Año 1986	41
9 - Tasa de mortalidad según edad y sexo (por mil) Año 1987	42

INDICE DE MAPAS

1 - Nacimientos según residencia habitual de la madre Promedio del período 1983-1987	18
2 - Tasa de mortalidad infantil (por mil) según resi- dencia habitual de la madre. Año 1985	51
3 - Tasa de mortalidad infantil (por mil) según resi- dencia habitual de la madre. Año 1986	54
4 - Tasa de mortalidad infantil (por mil) según resi- dencia habitual de la madre. Año 1987	57

ANALISIS DE LOS DATOS

En la descripción y análisis de la evolución de una población, existen dos aspectos a tener en cuenta: el estado o composición de la población en un momento en el tiempo, información que se obtiene fundamentalmente de los censos y el movimiento, conocimiento de la población a través del registro continuo de las estadísticas vitales (nacimientos, matrimonios, defunciones) y de las migraciones. En este boletín, la atención se centra en el análisis de la información proveniente de las estadísticas vitales.

Una población cerrada crece, en la medida que los nacimientos exceden a las muertes, pero para explicar esta relación es necesario introducir un tercer elemento: la estructura etaria de la población, ya que en cualquier población existe una importante relación entre la estructura etaria y el nivel general de la natalidad y la mortalidad.

Las poblaciones que mantienen durante un período prolongado, una elevada fecundidad, se caracterizan por tener una proporción relativamente importante de individuos en edades jóvenes (menores de 15 años) y una proporción relativamente pequeña en edades avanzadas (65 años y más); la situación inversa se encuentra en poblaciones con baja fecundidad. Es decir, que las poblaciones que ya han completado la transición demográfica de una alta a una baja fecundidad, son las que presentan una estructura relativamente vieja; por lo que el envejecimiento de la población resulta en este caso, del descenso de la fecundidad.

Esta es la situación que presenta la población de la Ciudad de Buenos Aires, que para el período 1984-87 registra una proporción de jóvenes del 20% y de personas en edades avanzadas del 16%, siendo la edad mediana de la población, promedio de ese período, de 37,4 años.

Una de las implicancias más significativas del envejecimiento relativo de la población es el aumento de la "carga de dependencia", esto es la relación de personas menores de 15 años y de 65 años y más, respecto del grupo de 15 a 64 años, que representa un índice aproximado del número de personas dependientes que soporta cada activo; en el caso de Buenos Aires

este índice es del 56% en promedio en el período 1984-87.

Otra característica de la población de Buenos Aires, es la distinta composición por sexo, el índice de masculinidad es de 84%, es decir que hay 84 hombres por cada 100 mujeres; la explicación a este hecho se encuentra en el efecto de la edad, ya que con el aumento de la edad y a causa de la sobremortalidad masculina, la relación de masculinidad es decreciente.

Se ha mencionado la tendencia decreciente de la natalidad que se ha registrado en Buenos Aires. La tasa de natalidad no se considera un indicador adecuado para el análisis de esta variable, ya que no está exenta del efecto de factores extrínsecos como son: la proporción de mujeres en edades reproductivas, la distribución de dichas mujeres en los diferentes grupos de edad dentro del período reproductivo y la distribución relativa de la fecundidad según la edad.

Las tasas de fecundidad por edad constituyen un indicador de fecundidad con mayor grado de precisión. Sumando las tasas de fecundidad de cada uno de los grupos etáricos se obtiene la tasa global de fecundidad, que permite el cálculo de la tasa bruta de reproducción, que es considerada como mejor indicador de la fecundidad, por ser una medida resumen y estar menos afectada por la estructura de la población.

La tasa bruta de reproducción es el número medio de nacimientos vivos femeninos al término del período de procreación, en ausencia de mortalidad. Proporciona un valor límite superior de las condiciones efectivas de sustitución de las generaciones. De acuerdo con los valores obtenidos, la tasa bruta de reproducción de las mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires ha descendido en forma continua en el período 1976-84, estando inclusive por debajo del nivel de reemplazo y registrando un incremento en los tres últimos años del período analizado (1985-87). La declinación de la fecundidad se corresponde con un descenso de las tasas de fecundidad de las mujeres de todas las edades; asimismo no se registran cambios en los patrones de la fecundidad en cuanto a la edad cúspide, que se ubica en el grupo etárico 25-29 años, estando la edad promedio de las madres alrededor de los 28 años. En cuanto a la concentración de la fecundidad, se observa que cerca

del 78% de los nacimientos tiende a concentrarse entre los 20 y 34 años.

La nupcialidad puede considerarse como una variable interviniente que permite interpretar ciertos fenómenos con mayor rigurosidad. Por ejemplo, se ha demostrado que existe relación entre la estructura por estado civil de la población y su nivel de natalidad, debido al hecho de que en la mayoría de las sociedades se espera que los nacimientos, o por lo menos una parte importante de ellos, ocurran dentro del matrimonio. La tasa bruta de nupcialidad es una medida afectada por la estructura por edades de la población, por lo que se ha considerado más significativo para analizar dicha relación el hecho de examinar la tasa de nupcialidad de las mujeres en edades fértiles por grupo quinquenal de edad.

La tendencia general del período analizado (1973-86) es decreciente en todos los grupos etáneos, especialmente en el grupo 15-19 años donde se registra un descenso del 41%. Es notorio a partir del año 1982 un aumento en el nivel de la tasa de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 34 años, hecho que probablemente tenga relación con el incremento de las tasas de fecundidad que experimentan esos grupos etáneos a partir del año 1984.

El otro componente del crecimiento vegetativo o natural de la población es la mortalidad. Con respecto a esta variable cabe mencionar que en este boletín se analiza tanto la mortalidad general, como así también la mortalidad infantil fetal que son objeto de especial atención y de un modo de estimación particular.

La evolución de la tasa de mortalidad general de la población de la Ciudad de Buenos Aires, presenta una tendencia estable, con un nivel promedio del 12,1 por mil, en el período 1970-87 mientras que una notoria tendencia decreciente registran las tasas de mortalidad infantil y mortalidad fetal. La primera, en el mismo período, se reduce en un 59% y la segunda lo hace en un 51%, con niveles promedios del orden del 23,4 por mil en el caso de la mortalidad infantil y del 7,8 por mil para la mortalidad fetal.

Con respecto a la mortalidad general, dos elementos de evidente diferenciación son la edad y el sexo, de allí la necesidad

de calcular tasas de mortalidad por edad y sexo. Las tasas por edad evidencian la evolución de los riesgos de la muerte con el avance de la edad, mientras que las tasas por sexo comprueban la existencia de sobremortalidad masculina.

En el período analizado (1984-87) se registra descenso en el nivel de las tasas de los menores de un año y de las personas de 65 años y más y permanecen prácticamente invariables las tasas de las personas con edades comprendidas entre 1 y los 64 años.

Es evidente asimismo, la existencia de sobremortalidad masculina en todos los grupos etáneos.

La mortalidad, en realidad es la consecuencia final de una o de varias causas o enfermedades, por lo tanto para un mejor conocimiento de las características de la mortalidad es necesario el análisis de las tasas de mortalidad según causa. Pero como la estructura de causas de muerte es diferencial según grupo etáneo, es necesario estudiar las tasas de mortalidad según causa y grupo etáneo.

Con respecto al análisis de las causas, se realizó a partir del nivel que registran las tasas de las principales causas de muerte en el año 1984 para cada grupo etáneo y que llegan hasta un mismo nivel mínimo de mortalidad para cada sexo.

Es necesario destacar que la causa "disritmia cardíaca" se ve sobreestimada por la gran cantidad de certificaciones "paro cardiorespiratorio no traumático", que ha registrado una participación promedio del 29% en el período 1984-86, descendiendo en el año 1987 a una participación del 5%, lo que indicaría una mejor calidad de la certificación de causa de muerte. Debido a ello, si bien se la presenta en los cuadros, no se la tiene en cuenta en el análisis de las principales causas de muerte promedio del período 1984-87. Por otro lado, en 1987 se incrementa el peso relativo de "otras enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón", que de una participación promedio del 10% en el período 1984-86, presenta un peso del 21% en el año 1987. Este hecho encuentra su explicación en el aumento del número de certificaciones "insuficiencia cardio-respiratoria" que en la tabulación básica de causa de muerte se incluyen dentro

de esta categoría. A continuación se presenta el análisis de las principales causas de muerte (promedio del período 1984-87) para cada grupo etario y por sexo.

El estudio realizado demuestra que para los menores de un año (ambos sexos) las causas que han registrado mayor nivel han sido: "hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del recién nacido" (42,7 por diez mil en varones y 29,3 por diez mil en mujeres), "crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal" (20,8 por diez mil en varones y 19,8 por diez mil en mujeres) y "otras afecciones originadas en el período perinatal" (33,5 por diez mil en varones y 25,1 por diez mil en mujeres). Para el grupo 1-4 años, varones: "neumonía" (0,5 por diez mil), "leucemia" (0,3 por diez mil) y "anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio" (0,3 por diez mil); mujeres: "anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio" (0,6 por diez mil). En el grupo 5-14 años, varones: "leucemia" (0,5 por diez mil) y "accidentes de tráfico de vehículos de motor" (0,3 por diez mil), ésta también es la causa principal en el caso de las mujeres (0,2 por diez mil). Para el grupo 15-49 años, varones: "otras enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón" (2,2 por diez mil) y "tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón" (1,4 por diez mil) y en las mujeres "tumor maligno de la mama" (1,3 por diez mil). En el grupo 50-64 años, varones: "infarto agudo del miocardio" (15,1 por diez mil), "otras enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón" (20,2 por diez mil) y "tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón" (13,1 por diez mil) y en las mujeres "tumor maligno de la mama" (7,0 por diez mil) y "otras enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón" (6,7 por diez mil). Para el grupo 65-74 años (ambos sexos) "otras enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón" (53,9 por diez mil en varones y 26,4 por diez mil en mujeres), "infarto agudo del miocardio" (34,6 por diez mil en varones y 12,2 por diez mil en mujeres) y "enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida" (24,7 por diez mil en varones y 12,9 por diez mil en mujeres). Finalmente para el grupo 75 años y más y para ambos sexos, se registran las mismas causas que para el grupo anterior, si bien las tasas de mortalidad presentan un nivel mayor.

En el caso de la mortalidad infantil, también se han analizado las causas a través de la aplicación de la agrupación de causas de muerte basada en la aplicación de criterios de evitabilidad, propuesta por la Dra. Erica Taucher. Para el período 1985-87, en la estructura de causas ha tenido una participación creciente el grupo de causas reducibles, que registra en el año 1987 una participación del orden del 42%, mientras que los demás grupos decrecen en importancia: parcialmente reducibles (25%), no evitables (19%) y otras causas y desconocidas (13%). Estos valores demuestran que existe todavía una parte muy importante de la mortalidad infantil que es factible controlar, lo que permitiría reducir aún más su nivel.

Con relación a la mortalidad fetal, se evidencian dos características relevantes, una con respecto al tiempo de gestación y otra con respecto al sexo. Es notoria la existencia de la participación mayoritaria de las defunciones con 28 semanas y más de gestación (81% del total) y de sobremortalidad masculina para todos los períodos de gestación. En el año 1987 la tasa de mortalidad fetal del sexo masculino es un 22% superior a la del sexo femenino.

Se ha analizado asimismo, la estructura de las causas de muerte según tiempo de gestación. Para el grupo de menos de 20 semanas de gestación la principal causa de muerte y que ha registrado una tendencia creciente en el período 1984-87 ha sido "hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto", que representa el 50% de las defunciones fetales de menos de 20 semanas de gestación; también es la principal causa de muerte del grupo 20-27 semanas, pero en este grupo con una participación relativa del 66% del total. Por último en el grupo de 28 semanas y más, las principales causas han sido: la ya citada (52%), "complicaciones obstétricas que afectan al feto" (31%) y "enfermedades de la madre que afectan al feto" (8%).

Finalmente, con respecto a la estructura etaria de las madres que registran defunciones con 28 semanas y más de gestación, en el período 1984-87 el 82% en promedio de las defunciones fetales tardías, se ubican entre los 20 y 39 años de edad.

P O B L A C I O N

POBLACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 1984, POR SEXO Y EDAD. (1)

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	VARONES	MUJERES
T O T A L	2.905.862	1.328.097	1.577.765
0 - 4	224.396	114.994	109.402
5 - 9	179.667	92.345	87.322
10 - 14	166.658	83.636	83.022
15 - 19	175.884	86.692	89.192
20 - 24	214.511	103.931	110.580
25 - 29	212.325	103.601	108.724
30 - 34	195.871	90.753	105.118
35 - 39	191.539	88.538	103.001
40 - 44	177.807	80.469	97.338
45 - 49	169.609	76.574	93.035
50 - 54	182.162	81.817	100.345
55 - 59	188.772	82.032	106.740
60 - 64	171.478	73.047	98.431
65 - 69	145.284	58.979	86.305
70 - 74	130.866	50.131	80.735
75 Y MAS	179.033	60.558	118.475

INDICADORES:

Edad mediana de la poblacion (ambos sexos): 37,18 años.

Edad mediana - Sexo Masculino: 34,34 años.

Edad mediana - Sexo Femenino: 39,64 años.

Indice de masculinidad: 84,2 %

Indice de dependencia potencial: 54,6 %

Relacion niños/mujeres (0-4 / 15-49): 31,74 %

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos en base a estimacion de I.N.D.E.C., periodo 1970/1990.

POBLACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 1985, POR SEXO Y EDAD. (1)

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	VARONES	MUJERES
TOTAL	2.901.328	1.324.622	1.576.706
0 - 4	227.745	116.743	111.002
5 - 9	179.584	92.431	87.153
10 - 14	167.322	83.795	83.527
15 - 19	171.605	85.115	86.490
20 - 24	211.138	101.913	109.225
25 - 29	210.656	103.501	107.155
30 - 34	192.339	88.691	103.648
35 - 39	192.424	88.923	103.501
40 - 44	179.758	81.085	98.673
45 - 49	166.511	74.967	91.544
50 - 54	177.952	80.021	97.931
55 - 59	189.967	82.292	107.675
60 - 64	174.098	74.309	99.789
65 - 69	143.104	57.973	85.131
70 - 74	133.084	50.915	82.169
75 Y MAS	184.041	61.948	122.093

INDICADORES:

Edad mediana de la poblacion (ambos sexos): 37,35 años.

Edad mediana - Sexo Masculino: 34,44 años.

Edad mediana - Sexo Femenino: 39,84 años.

Indice de masculinidad: 84,0 %

Indice de dependencia potencial: 55,44 %

Relacion niños/mujeres (0-4 / 15-49): 32,52 %

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos en base a estimacion de I.N.D.E.C., periodo 1970/1990.

POBLACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 1986, POR SEXO Y EDAD. (1)

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	VARONES	MUJERES
TOTAL	2.901.375	1.324.210	1.577.165
0 - 4	225.246	115.463	109.783
5 - 9	185.693	95.670	90.023
10 - 14	168.252	84.716	83.536
15 - 19	173.500	86.211	87.289
20 - 24	208.023	101.276	106.747
25 - 29	207.774	101.833	105.941
30 - 34	190.725	88.539	102.186
35 - 39	188.780	86.592	102.188
40 - 44	180.987	81.528	99.459
45 - 49	168.865	75.667	93.198
50 - 54	175.199	78.532	96.667
55 - 59	186.150	80.648	105.502
60 - 64	175.691	74.673	101.018
65 - 69	145.981	59.280	86.701
70 - 74	131.486	50.166	81.320
75 Y MAS	189.023	63.416	125.607

INDICADORES:

Edad mediana de la poblacion (ambos sexos): 37,42 años.

Edad mediana - Sexo Masculino: 34,36 años.

Edad mediana - Sexo Femenino: 40,04 años.

Indice de masculinidad: 84,0 %

Indice de dependencia potencial: 56,3 %

Relacion niños/mujeres (0-4 / 15-49): 32,32 %

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos en base a estimacion de I.N.D.E.C., periodo 1970/1990.

POBLACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 1987, POR SEXO Y EDAD. (1)

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	VARONES	MUJERES
TOTAL	2.901.422	1.323.797	1.577.625
0 - 4	222.747	114.183	108.564
5 - 9	191.802	98.909	92.893
10 - 14	169.183	85.638	83.545
15 - 19	175.395	87.307	88.088
20 - 24	204.908	100.639	104.269
25 - 29	204.893	100.165	104.728
30 - 34	189.110	88.387	100.723
35 - 39	185.136	84.261	100.875
40 - 44	182.217	81.972	100.245
45 - 49	171.219	76.366	94.853
50 - 54	172.445	77.042	95.403
55 - 59	182.333	79.005	103.328
60 - 64	177.284	75.037	102.247
65 - 69	148.858	60.588	88.270
70 - 74	129.888	49.417	80.471
75 Y MAS	194.004	64.881	129.123

INDICADORES:

Edad mediana de la poblacion (ambos sexos): 37,50 años.

Edad mediana - Sexo Masculino: 34,25 años.

Edad mediana - Sexo Femenino: 40,26 años.


Indice de masculinidad: 83,9 %

Indice de dependencia potencial: 57,3 %

Relacion niños/mujeres (0-4 / 15-49): 32,11 %

Fuente: Direccion de Estadística y Censos en base a estimacion de i.n.d.e.c., periodo 1970/1990.

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - AÑO 1987



BASE: 2.901.422 (100%)

NATALIDAD

HACIMIENTOS SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE - (CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL)
PERIODO 1983 - 1987

ANO	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8
1983	41.046	1.282	947	1.068	957	2.414	1.646	2.006	851
1984	39.893	1.209	1.026	1.065	950	2.123	1.759	1.897	798
1985	44.258	2.273	1.221	1.164	998	2.496	1.810	2.088	890
1986	44.806	2.823	1.596	1.171	971	2.424	1.768	1.975	921
1987	43.884	2.546	1.314	972	981	2.367	1.759	1.933	910

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.442	727	713	786	867	587	1.692	1.820	2.922	2.737	2.702
1.403	753	676	773	880	623	1.479	1.882	2.776	2.621	2.558
1.586	714	811	834	917	670	1.792	1.880	3.115	2.823	2.758
1.780	767	768	795	889	740	1.756	1.835	2.966	2.901	2.769
2.531	718	747	849	910	697	1.668	1.828	2.751	2.833	2.554

20	21	22	23	24	25	26	27	28	DESC.
936	1.549	1.781	1.541	1.191	1.337	1.532	1.075	1.713	225
847	1.363	1.764	1.441	1.165	1.109	1.536	1.074	1.701	642
881	1.544	2.222	1.594	1.284	1.346	1.598	1.002	1.779	178
901	1.485	2.382	1.545	1.209	1.333	1.531	1.128	1.634	57
954	1.513	2.339	1.593	1.208	1.246	1.445	1.011	1.662	45

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

NACIMIENTOS DE RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SEGUN EDAD DE LA MADRE.
PERIODO 1974 - 87.

....	..	ANO
....	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
EDAD
TOTAL	52.825	55.412	54.029	51.913	48.932	46.467	44.100
15 - 19	3.347	3.735	3.349	2.923	2.899	2.569	2.434
20 - 24	13.950	14.194	13.454	12.657	11.323	10.499	10.059
25 - 29	19.376	19.044	19.047	17.070	17.170	16.376	16.003
30 - 34	10.969	11.654	11.906	11.914	11.479	11.142	10.822
35 - 39	4.507	4.850	4.849	4.959	4.724	4.645	4.638
40 - 44	1.242	1.316	1.214	1.190	1.089	1.041	1.082
45 - 49	175	294	179	184	158	128	119
DESC.	309	323	231	147	90	67	63

....	..	ANO
....	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
EDAD
TOTAL	43.070	41.031	41.046	39.893	44.258	44.806	43.884
15 - 19	2.447	2.157	2.110	2.045	2.365	2.615	2.567
20 - 24	9.715	8.950	8.891	8.533	9.254	9.317	8.816
25 - 29	14.617	13.807	14.078	13.650	14.616	14.653	14.223
30 - 34	10.375	10.247	10.214	9.765	10.744	10.649	10.450
35 - 39	4.696	4.658	4.631	4.594	5.172	5.221	5.100
40 - 44	1.085	1.067	983	1.007	1.202	1.246	1.195
45 - 49	102	113	97	196	146	176	154
DESC.	33	32	42	103	759	929	1.379

Fuente: Estadísticas Vitales. Dirección de Estadística y Censos.

POBLACION FEMENINA (en miles) DE 15 A 49 AÑOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
PERIODO: AÑOS 1974 - 1987.

...	AÑO
...	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
EDAD
15 - 19	110	110	108	105	103	100	98
20 - 24	135	135	131	127	123	119	115
25 - 29	115	116	116	116	116	116	116
30 - 34	99	99	102	104	107	109	112
35 - 39	96	94	96	97	99	100	102
40 - 44	109	107	104	101	99	96	93
45 - 49	117	117	113	110	106	103	99

...	AÑO
...	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
EDAD
15 - 19	97	94	92	89	86	87	88
20 - 24	115	113	112	111	109	107	104
25 - 29	113	112	110	109	107	106	105
30 - 34	109	108	106	105	104	102	101
35 - 39	101	102	102	103	103	102	101
40 - 44	93	95	96	97	99	99	100
45 - 49	97	96	94	93	91	93	95

Fuentes: Censo Nacional de Poblacion, Familias y Vivienda. 1970, I.N.D.E.C.

Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. 1980, I.N.D.E.C.

Serie Anual de la Poblacion de la Capital Federal por sexo y grupo de edades. 1960-75, I.N.D.E.C.

Estimaciones y proyecciones de poblacion por sexo y edad. 1970/90. I.N.D.E.C.

Interpolacion para el periodo 1976-80 y 1981-83. Direccion de Estadistica y Censos

TASAS DE FECUNDIDAD, POR EDAD (por mil). RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
PERIODO: 1974 - 87.

....
...	ANO
....	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
EDAD
15 - 19	30,43	33,95	31,01	27,84	28,15	25,69	24,84
20 - 24	103,33	105,14	102,70	99,66	92,06	88,23	87,60
25 - 29	159,36	164,19	162,47	154,65	148,02	141,17	128,59
30 - 34	110,80	117,72	116,72	114,56	107,28	102,22	96,76
35 - 39	46,95	51,60	50,51	51,12	47,72	46,45	45,40
40 - 44	11,39	12,30	11,67	11,78	11,00	10,84	11,62
45 - 49	1,50	2,51	1,58	1,67	1,49	1,24	1,20
TOTAL	463,75	487,41	476,66	461,28	435,72	415,84	396,01
I.G.F	2,32	2,44	2,38	2,31	2,18	2,08	1,98
R'	1,13	1,19	1,16	1,13	1,06	1,01	0,96
M	27,86	27,94	28,02	28,24	28,29	28,41	28,51

...
...	AÑO
...	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
EDAD
15 - 19	25,23	22,95	22,93	22,98	27,50	30,06	29,17
20 - 24	84,74	79,00	79,43	76,87	84,90	87,07	84,77
25 - 29	128,86	123,43	127,64	125,23	136,60	138,24	135,46
30 - 34	94,72	94,83	95,83	93,00	103,31	104,40	103,46
35 - 39	46,27	45,67	45,18	44,60	50,21	51,19	50,49
40 - 44	11,62	11,27	10,24	10,38	12,14	12,59	11,95
45 - 49	1,05	1,18	1,03	2,11	1,60	3,78	1,62
TOTAL	392,49	378,33	382,28	375,17	416,26	427,33	416,92
T.G.F	1,96	1,89	1,91	1,88	2,08	2,14	2,08
R'	0,95	0,92	0,93	0,91	1,02	1,04	1,02
M	28,52	28,71	28,68	28,77	28,80	28,75	28,78

T.G.F.: Tasa global de fecundidad. (hijos por mujer)


R': Tasa bruta de reproducción. (hijas por mujer)

M : Edad promedio de las madres. (en años)

Fuente: Dirección de Estadística y Censos.

GRAFICO 2

TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE MADRES RESIDENTES
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. PERIODO 1970-1987



ORDEN DE NACIMIENTO	1984	1985	1986	1987
TOTAL	39.893	44.258	44.806	43.884
1°	18.031	20.543	20.842	20.553
2°	12.606	13.280	13.160	12.860
3°	5.919	6.283	6.196	6.099
4°	2.005	2.332	2.307	2.223
5°	756	847	844	863
6°	305	344	362	363
7°	138	161	168	176
8°	54	64	86	87
9°	41	53	48	44
10° y MAS	37	127	141	131
IGNORADO	1	224	652	485
i	45,2	46,4	46,5	46,8

i: Peso relativo 1°orden en el total.

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos.


PARTICIPACION RELATIVA DE LOS NACIMIENTOS DE 1° ORDEN EN LOS NACIMIENTOS
SEGUN EDAD DE LA MADRE. PERIODO 1984-87.

EDAD DE LA MADRE	1984	1985	1986	1987	PROMEDIO 1984-87
- 15	85,4	68,5	61,4	67,9	70,8
15 - 19	80,0	81,7	79,6	79,0	80,1
20 - 24	63,4	64,2	63,0	62,3	63,2
25 - 29	47,0	47,6	48,3	48,0	47,7
30 - 34	30,8	31,9	32,4	31,8	31,7
35 - 39	25,4	26,2	26,2	25,5	25,8
40 - 44	25,2	25,2	28,2	27,5	26,5
45 - 49	23,6	30,5	29,3	27,0	27,6
50 Y MAS	35,5	35,9	50,6	53,8	43,9

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos.

GRAFICO 3

PARTICIPACION RELATIVA DE LOS NACIMIENTOS DE PRIMER ORDEN
SEGUN EDAD DE LA MADRE. PROMEDIO DEL PERIODO 1984-1987



NUPCIALIDAD

TASA DE MUJERES EN EDADES FERTILES (por mil) SEGUN EDAD AL CASARSE.

PERIODO: 1973 - 1986.

....
... AÑO
....	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	.
EDAD
15 - 19	25,57	28,66	28,61	27,96	26,57	25,51	20,61	.
20 - 24	94,11	95,75	89,46	84,58	80,54	78,09	73,58	.
25 - 29	63,04	62,56	58,44	53,82	49,64	47,59	44,59	.
30 - 34	21,79	23,43	21,97	20,38	20,48	18,29	15,82	.
35 - 39	9,11	9,65	9,58	9,31	8,24	8,15	7,20	.
40 - 44	4,62	4,87	5,66	5,07	4,62	4,04	3,61	.
45 - 49	3,32	3,35	3,73	3,80	3,39	2,96	2,67	.


....
... AÑO	*	.	.	.
....	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	.
EDAD
15 - 19	17,23	15,64	15,34	16,46	16,51	14,67	15,18	.
20 - 24	68,76	63,45	67,21	72,09	71,82	63,75	66,26	.
25 - 29	40,86	39,67	43,84	49,62	52,63	46,86	51,04	.
30 - 34	14,07	13,59	13,86	15,58	16,56	14,89	15,89	.
35 - 39	5,44	5,66	6,29	6,92	6,50	5,76	6,13	.
40 - 44	3,10	3,12	3,02	3,41	3,34	2,85	3,18	.
45 - 49	2,67	2,53	2,44	2,49	2,47	2,02	2,24	.

* Estimada.

FUENTE: Direccion de Estadística y Censos.

GRAFICO 4

TASA DE NUPCIALIDAD DE LAS MUJERES EN EDADES FERTILES
(POR MIL). PERÍODO 1973-86



MORTALIDAD

MORTALIDAD

TASA DE MORTALIDAD GENERAL - INFANTIL Y FETAL (por mil).


CIUDAD DE BUENOS AIRES - PERIODO 1970 - 1987

AÑO	T.M.G.	T.M.I.			T.M.F.
		TOTAL	NEONATAL	POSTNEO- NATAL	
1970	11,7	38,2	23,0	15,2	16,6
1971	11,5	31,8	19,7	12,1	14,6
1972	11,8	30,8	19,4	11,4	15,3
1973	12,1	29,5	19,2	10,4	10,4
1974	12,2	25,8	17,2	8,6	7,7
1975	12,3	27,2	18,0	9,1	7,2
1976	12,7	29,0	19,3	9,7	7,5
1977	12,4	28,1	19,5	8,6	7,2
1978	11,9	23,4	16,4	7,0	5,9
1979	11,8	20,6	15,2	5,4	6,2
1980	12,2	19,0	14,0	4,9	6,2
1981	11,4	18,3	13,8	4,5	6,7
1982	11,6	17,1	12,5	4,6	5,1
1983	12,3	18,2	12,6	5,6	5,1
1984	12,8	17,5	12,7	4,8	2,8
1985	12,2	15,2	11,0	4,2	3,3
1986	11,9	16,0	11,9	4,1	4,5
1987	12,6	15,5	11,9	3,6	8,1

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

GRAFICO 5

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y FETAL EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. TASAS POR MIL. PERIODO 1970-1987



MORTALIDAD GENERAL

DEFUNCIONES DE RESIDENTES SEGUN EDAD Y SEXO. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Periodo: 1984 - 87.

MUJERES

..... AÑO.				
..... 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
EDAD .				
TOTAL	18.770	17.876	17.251	18.406
- 1	333	265	309	295
1 - 4	45	52	54	54
5 - 14	63	49	73	77
15 - 49	933	907	884	945
50 - 64	2.288	2.174	2.140	2.091
65 - 74	3.903	3.564	3.409	3.592
75 Y MAS	11.157	10.794	10.309	11.332
IGNORADA	48	71	73	20

VARONES

..... AÑO.				
..... 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
EDAD .				
TOTAL	18.487	17.507	17.206	18.255
- 1	426	403	406	385
1 - 4	57	43	68	70
5 - 14	78	69	96	91
15 - 49	1.352	1.220	1.382	1.399
50 - 64	4.170	3.868	3.722	3.891
65 - 74	4.903	4.645	4.521	4.836
75 Y MAS	7.474	7.212	6.852	7.521
IGNORADA	27	47	159	62

IGNORADO

..... AÑO.				
..... 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
EDAD .				
TOTAL	25	30	50	10
- 1	-	3	1	-
1 - 4	-	-	7	1
5 - 14	-	1	15	-
15 - 49	-	3	0	-
50 - 64	-	6	3	1
65 - 74	-	6	5	-
75 Y MAS	-	8	7	6
IGNORADA	-	3	12	2

TOTAL

..... AÑO.				
..... 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
EDAD .				
TOTAL	37.282	35.413	34.507	36.671
- 1	759	671	716	680
1 - 4	102	95	129	125
5 - 14	141	119	184	168
15 - 49	2.285	2.130	2.266	2.344
50 - 64	6.485	6.048	5.865	5.983
65 - 74	8.806	8.215	7.935	8.428
75 Y MAS	18.631	18.014	17.168	18.859
IGNORADA	75	121	244	84

* No se dispone de la informacion desagregada por edad.

Fue procesado por la Sec. Salud Publica de Nacion.

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos.

TASAS DE MORTALIDAD (por mil) DE RESIDENTES SEGUN EDAD Y SEXO. CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Periodo: 1984 - 87. (2) (3)

MUJERES					VARONES				
AÑO					AÑO				
	1984	1985	1986	1987		1984	1985	1986	1987
EDAD					EDAD				
TOTAL	11,9	11,3	10,9	11,7	TOTAL	13,9	13,2	13,0	13,8
- 1	15,9	12,4	14,2	13,5	- 1	19,1	17,7	17,6	16,7
1 - 4	0,3	0,6	0,6	0,6	1 - 4	0,6	0,4	0,7	0,8
5 - 14	0,4	0,3	0,4	0,4	5 - 14	0,4	0,4	0,5	0,5
15 - 49	1,3	1,3	1,3	1,4	15 - 49	2,1	1,9	2,2	2,3
50 - 64	7,5	7,1	7,1	6,9	50 - 64	17,6	16,3	15,9	16,8
65 - 74	23,4	21,3	20,3	21,3	65 - 74	44,9	42,7	41,3	44,0
75 Y MAS	94,2	88,4	82,1	87,8	75 Y MAS	123,4	116,4	108,0	115,9

TOTAL

	AÑO	1984	1985	1986	1987
EDAD					
TOTAL		12,8	12,2	11,9	12,6
- 1		17,5	15,2	16,0	15,5
1 - 4		0,5	0,5	0,7	0,7
5 - 14		0,4	0,3	0,5	0,5
15 - 49		1,7	1,6	1,7	1,8
50 - 64		11,9	11,2	10,9	11,2
65 - 74		31,9	29,7	28,6	30,2
75 Y MAS		104,1	97,9	90,8	97,2

GRAFICO 6

TASA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD Y SEXO (POR MIL)
AÑO 1984




GRAFICO 7

TASA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD Y SEXO (POR MIL)

AÑO 1985





GRAFICO 8

TASA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD Y SEXO (POR MIL)

AÑO 1986




DIRECCION DE ESTADISTICAS y CENSOS

BIBLIOTECA

GRAFICO 9

TASA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD Y SEXO (POR MIL)

AÑO 1987



DEFUNCIONES DE RESIDENTES SEGUN EDAD, SEXO Y CAUSA DE MUERTE. (Lista Basica).
TASAS DE MORTALIDAD (por diez mil). CIUDAD DE BUENOS AIRES. Periodo: 1984 - 1987.(2)(3)

- 1 AÑO

VARONES					MUJERES				
CAUSA	1984	1985	1986	1987	CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)					(4)				
459	43,5	33,7	24,3	32,6	459	34,8	19,1	21,2	25,3
454	40,4	41,6	42,5	46,5	454	32,4	23,3	31,3	30,3
452	15,2	23,7	23,0	21,3	452	16,2	26,6	15,6	20,7
442	13,5	14,5	15,6	13,9	442	15,7	8,4	13,3	8,7
449	9,9	7,0	10,8	8,7	449	10,5	8,4	6,9	8,3
321	8,5	8,3	9,1	6,5	321	10,0	6,5	7,4	4,6
440	5,8	2,2	1,7	0,9	440	5,7	2,8	4,1	2,7

1 - 4 AÑOS

VARONES					MUJERES				
CAUSA	1984	1985	1986	1987	CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)					(4)				
229	0,4	0,2	0,1	0,2	281 (5)	0,9	0,9	0,5	0,1
281 (5)	0,4	0,3	0,4	0,1	442	0,5	0,4	0,9	0,8
321	0,4	0,4	1,1	0,2	321	0,3	0,8	-	0,3
141	0,3	0,3	0,5	0,2	500	0,3	-	-	-
442	0,3	0,4	0,3	0,3					
449	0,3	0,3	-	0,2					
471	0,3	0,1	0,1	0,2					
529	0,3	-	0,2	0,2					

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

5 - 14 AÑOS

VARONES

CAUSA . 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
(4)				
141	0,6	0,4	0,5	0,4
471	0,5	0,4	0,3	0,2
281 (5)	0,4	0,4	0,9	0,1
500	0,2	-	-	-
540	0,2	-	-	-

MUJERES

CAUSA . 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
(4)				
200	0,3	0,2	0,1	0,1
281 (5)	0,3	0,3	0,8	0,1
471	0,3	0,2	0,2	0,2
349	0,2	0,1	-	0,2
431	0,2	0,1	-	-
442	0,2	0,3	0,1	0,2
482	0,2	0,1	-	-
523	0,2	0,1	-	-

15 - 49 AÑOS

VARONES

CAUSA . 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
(4)				
281 (5)	3,1	3,2	3,4	0,7
289	1,5	1,6	2,3	3,6
101	1,4	1,4	1,4	1,5
270	1,1	0,9	1,1	1,6
471	1,1	0,7	1,1	0,8
540	1,0	-	-	-

MUJERES

CAUSA . 1984 . 1985 . 1986 . 1987 .				
(4)				
281 (5)	2,1	2,6	1,9	0,6
113	1,3	1,3	1,2	1,4

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

50 - 64 AÑOS

VARONES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	41,5	42,5	35,9	6,6
270	16,9	13,6	13,3	16,7
101	14,3	13,1	11,5	13,5
289	14,1	14,0	18,0	34,9
293	9,0	7,3	7,2	9,4
279	5,7	4,1	6,0	6,4
349	5,1	4,0	3,6	5,1

MUJERES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	17,7	17,7	16,0	2,9
113	6,8	6,2	7,3	7,8
289	5,1	4,5	5,7	11,5

65 - 74 AÑOS

VARONES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	123,9	130,8	111,6	19,5
289	39,7	38,8	48,1	88,9
270	34,9	30,8	30,3	42,4
293	25,2	22,1	21,4	30,3
101	22,4	18,6	18,7	24,4
279	18,5	15,3	15,6	17,0
349	10,0	8,0	8,3	11,2

MUJERES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	67,2	68,4	55,8	10,0
289	20,4	17,9	23,2	44,0
293	14,3	12,2	10,9	14,4
270	13,5	10,8	12,0	12,7

75 Y MAS AÑOS

VARONES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	409,8	427,6	346,1	61,3
289	129,1	113,0	123,6	260,8
300	80,7	67,1	60,9	80,3
270	65,9	57,8	57,1	81,7
293	56,5	48,3	50,1	75,5
279	50,5	47,0	40,0	54,4
321	39,5	29,9	25,9	37,8
101	26,9	24,2	24,8	29,6
124	20,5	18,4	21,9	28,8
329	20,1	12,3	15,8	27,1
349	20,1	18,9	17,5	30,2

MUJERES

CAUSA	1984	1985	1986	1987
(4)				
281(5)	322,2	327,6	279,8	46,7
289	102,7	96,7	98,8	210,4
300	92,0	74,3	66,0	91,4
293	59,5	51,7	45,4	76,5
270	45,5	37,7	35,6	52,4
279	42,5	36,0	31,8	40,1
321	25,0	19,2	19,0	23,2

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos.

MORTALIDAD INFANTIL

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1985.


CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
TOTAL	15,2	5,3	4,1	3,5	2,3
1	14,5	4,4	4,8	3,1	2,2
2	22,9	9,0	7,3	3,3	3,3
3	20,6	6,0	6,9	3,4	4,3
4	14,0	7,0	2,0	4,0	1,0
5	14,9	5,2	5,2	3,2	1,3
6	14,4	3,9	6,1	2,8	1,6
7	10,5	2,9	0,9	3,8	2,9
8	21,3	5,6	4,5	5,6	5,6
9	18,9	7,5	5,0	3,9	2,5
10	14,0	4,2	4,2	2,8	2,8
11	18,5	6,1	2,5	7,4	2,5
12	10,0	3,6	3,6	1,2	3,6
13	16,4	4,4	4,4	6,5	1,1
14	22,4	7,5	8,9	3,0	3,0

FUENTE: Direccion de Estadística y Censos.

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1985. (CONTINUACION)

CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
15	13,4	4,6	7,2	1,1	0,5
16	18,1	6,9	3,7	6,4	1,1
17	9,0	2,9	2,6	1,9	1,6
18	11,6	4,9	3,9	0,7	2,1
19	14,3	7,0	2,3	2,3	2,7
20	9,1	2,3	3,4	2,3	1,1
21	12,3	5,8	3,2	2,6	6,5
22	24,7	10,3	4,0	5,9	4,5
23	20,7	6,9	5,6	6,3	1,9
24	17,1	7,8	3,1	4,7	1,5
25	18,6	4,5	4,5	5,9	3,7
26	13,1	3,1	2,5	5,6	1,9
27	16,0	5,0	5,0	3,0	3,0
28	10,1	2,8	3,4	1,7	2,2

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) SEGUN RESIDENCIA
HABITUAL DE LA MADRE - AÑO 1985



TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1986.

CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
TOTAL	16,0	5,6	4,0	4,4	2,0
1	11,7	3,5	3,9	3,2	1,1
2	35,7	10,0	11,0	9,4	4,4
3	21,3	5,1	6,0	8,5	1,7
4	20,6	14,5	5,1	1,0	0,0
5	10,7	2,9	4,5	0,4	2,9
6	12,4	2,3	1,1	6,2	2,8
7	12,1	2,0	3,0	4,1	3,0
8	30,4	10,8	10,8	6,5	2,3
9	14,0	6,2	3,4	2,8	1,6
10	22,1	9,1	5,2	7,8	0,0
11	23,4	10,4	3,9	5,2	3,9
12	20,1	3,8	6,3	10,0	0,0
13	27,0	10,1	6,7	7,9	2,3
14	23,0	9,5	4,0	6,8	2,7

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1986. (CONTINUACION)

CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
15	13,0	4,5	1,7	4,5	2,3
16	13,1	3,8	4,9	3,8	5,4
17	15,2	5,4	3,0	5,1	1,7
18	14,1	3,1	2,1	5,2	3,7
19	11,5	3,6	3,6	3,2	1,1
20	6,6	3,3	3,3	0,0	0,0
21	17,5	8,1	2,7	4,7	2,0
22	19,3	8,8	2,5	6,3	1,7
23	18,7	8,4	3,9	4,5	1,9
24	14,1	4,1	5,0	1,7	3,3
25	11,2	4,5	3,0	2,2	1,5
26	14,3	5,2	3,9	3,9	1,3
27	15,1	8,0	1,8	1,8	3,5
28	12,8	4,3	3,0	4,3	1,2

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1987.

CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
TOTAL	15,5	6,5	3,9	3,0	2,0
1	11,0	5,9	2,0	1,6	1,6
2	25,9	9,9	9,1	3,8	3,0
3	18,5	12,3	2,1	3,1	1,0
4	20,4	9,2	3,1	1,0	7,1
5	16,9	7,2	3,4	4,2	2,1
6	15,3	8,5	4,5	1,7	0,6
7	11,9	4,7	3,1	3,1	1,0
8	18,7	8,8	5,5	2,2	2,2
9	10,7	3,2	1,6	3,2	2,8
10	23,7	8,3	9,7	1,4	4,2
11	25,4	13,4	6,7	2,7	2,7
12	21,2	13,0	3,5	3,5	1,2
13	18,7	5,5	7,7	3,3	2,2
14	17,2	5,7	2,9	5,7	2,9


TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 1987. (CONTINUACION)

CAUSA	TOTAL	REDUCIBLES	PARCIALMENTE REDUCIBLES	NO EVITABLES	OTRAS CAUSAS Y DESCONOCIDAS
CIRC.....(6)					
ELECTORAL.....					
15	15,0	4,8	3,6	3,0	3,6
16	16,4	6,0	3,8	5,5	1,1
17	15,6	5,8	4,0	4,0	1,8
18	11,3	5,3	1,8	2,8	1,4
19	14,5	7,0	3,9	2,7	0,8
20	22,0	8,4	4,2	6,3	3,1
21	17,2	5,9	8,6	0,7	2,0
22	20,5	9,8	2,6	5,1	3,0
23	21,3	6,3	6,3	3,8	5,0
24	9,1	0,8	5,8	2,5	-
25	11,2	4,8	1,6	3,2	1,6
26	10,4	4,8	3,5	2,1	-
27	7,9	2,0	3,0	1,0	2,0
28	11,4	4,8	3,6	1,2	1,8

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

MAPA 4

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) SEGUN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE - AÑO 1987



MORTALIDAD FETAL

DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION (en semanas) Y SEXO.
Residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Periodo: 1982 - 87.

AÑO Y SEXO	TIEMPO DE GESTACION			
	TOTAL	- 20	20 A 27	28 Y MAS
1982				
TOTAL	227	1	22	204
VARON	121	1	16	104
MUJER	106	-	6	100
1983				
TOTAL	210	*	*	*
VARON	118	*	*	*
MUJER	92	*	*	*
1984				
TOTAL	123	6	22	95
VARON	65	1	12	52
MUJER	58	5	10	43
1985				
TOTAL	148	4	25	119
VARON	81	2	18	61
MUJER	67	2	7	58
1986				
TOTAL	201	7	31	163
VARON	109	5	18	86
MUJER	92	2	13	77
1987				
TOTAL	357	16	53	288
VARON	202	11	24	167
MUJER	155	5	29	121

Nota: * No se dispone de la informacion.

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

TASA DE MORTALIDAD FETAL (por mil) SEGUN SEXO.

Residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Periodo: 1982 - 87.

AÑO	TOTAL	VARONES	MUJERES
1982	5,1	5,8	5,2
1983	5,1	5,6	4,6
1984	2,8	2,9	2,8
1985	3,3	3,5	3,1
1986	4,5	4,7	4,2
1987	8,1	8,9	7,3

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION Y CAUSA DE MUERTE (Lista Basica).
Residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Periodo: 1984 - 87.

TOTAL

CAUSA	1984	1985	1986	1987
048	-	-	-	1
399	-	1	-	-
440	1	1	1	-
441	3	1	6	7
442	-	1	1	-
449	4	2	-	7
450	7	10	4	27
451	31	23	40	102
452	-	-	4	4
454	73	103	133	194
455	-	-	7	2
459	3	6	4	10
469	1	-	1	3

20 - 27 SEMANAS

CAUSA	1984	1985	1986	1987
441	-	-	1	-
442	-	1	-	-
450	-	1	-	2
451	5	3	5	12
452	-	-	-	1
454	16	19	22	35
459	-	1	2	3
469	1	-	1	-

- 20 SEMANAS

CAUSA	1984	1985	1986	1987
449	1	-	-	-
450	-	2	-	3
451	-	-	2	2
454	2	2	5	8
455	-	-	-	1
459	3	-	-	1
469	-	-	-	1

28 SEMANAS Y MAS

CAUSA	1984	1985	1986	1987
048	-	-	-	1
399	-	1	-	-
440	1	1	1	-
441	3	1	5	7
442	-	-	1	-
449	3	2	-	7
450	7	7	4	22
451	26	20	33	88
452	-	-	4	3
454	55	82	106	151
455	-	-	7	1
459	-	5	2	6
469	-	-	-	2

Fuente: Direccion de Estadistica y Censos.

DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS (28 semanas y más) SEGUN EDAD DE LA MADRE
Residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Período: 1984 - 87.

EDAD DE LA MADRE	1984	1985	1986	1987
TOTAL	95	119	163	288
- 15	-	1	1	5
15 - 19	3	9	11	20
20 - 24	18	32	22	52
25 - 29	26	27	41	69
30 - 34	21	25	35	64
35 - 39	18	12	32	49
40 - 44	7	6	13	18
45 - 49	-	-	1	1
50 Y MAS	-	-	1	2
IGNORADA	2	7	6	8

Fuente: Direccion de Estadística y Censos.

- (1) Estimación realizada mediante interpolación lineal en base a las proyecciones de población quinquenal realizadas por I.N.D.E.C. para el período 1970/1990.
- (2) Para el cálculo de las tasas se adoptó como total de población del período, la estimación realizada mediante interpolación lineal en base a las proyecciones quinquenales de población elaboradas por I.N.D.E.C. para el período 1970/1990.
- (3) El ordenamiento de las causas se realizó a partir del nivel de las tasas en 1984 y se presentan las principales causas de muerte que llegan hasta un mismo nivel mínimo de mortalidad para cada sexo.
- (4) Ver lista básica para la tabulación de mortalidad.
- (5) Esta causa se ve sobreestimada por la gran cantidad de certificaciones "PARO CARDIO-RESPIRATORIO NO TRAUMÁTICO".
- (6) Ver agrupación de las causas de muerte de menores de 1 año basada en la aplicación de criterios de evitabilidad.

A N E X O S

DEFINICIONES OPERATIVAS Y FORMULAS UTILIZADAS

- EDAD MEDIANA DE LA POBLACION:

----- Edad que divide a la poblacion en dos partes iguales, tal que la mitad de la poblacion esta por debajo de esa edad y la otra mitad por encima de la misma.

- EDAD PROMEDIO DE LAS MADRES:

----- Edad media de las madres en el momento de nacer sus hijos.

- INDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL:

----- Carga que representa la poblacion inactiva en relacion a la activa en un año determinado.

$$IDP = \frac{N(0-14 \text{ años}) + N(65 \text{ años y mas})}{N(15-64 \text{ años})} \times 100$$

- INDICE DE MASCULINIDAD:

----- Relacion entre el numero total de hombres y el numero total de mujeres en un año determinado.

$$IM = \frac{NM}{MF} \times 100$$

- RELACION NIÑOS - MUJERES:

----- Relacion entre la poblacion de ambos sexos menor de 5 años de edad y la poblacion femenina en edad fértil para un año determinado.

$$RNM = \frac{N(0-4)}{MF(15-49)} \times 100$$

- TASA BRUTA DE MORTALIDAD:

Relacion entre el número de defunciones durante un año y la población media de ese año.

$$TBM = \frac{\frac{z}{D}}{\frac{z}{30-vi-z} \cdot H} \times 1000$$

- TASA BRUTA DE REPRODUCCION:

Numero de hijas que en promedio tendria cada mujer de una cohorte hipotetica de mujeres que durante el periodo fertil tuvieran hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el termino del periodo fertil. Se obtiene multiplicando la tasa global de fecundidad por la proporción de nacimientos femeninos.

$$R' = K \times TGF$$

- TASA DE CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO:

Ritmo al cual crece una población, balance entre las tasas de natalidad y mortalidad.

$$R = B - D$$

- TASA DE FECUNDIDAD POR EDAD:

Cociente entre los nacimientos de madres de una determinada edad X, y las mujeres de esa misma edad, para un año determinado.

$$F(x) = \frac{\frac{z}{B(x)}}{\frac{z}{30-vi-z} \cdot HF(x)} \times 1000$$

- TASA DE MORTALIDAD FETAL:

Relacion entre las defunciones intrauterinas, en un año dado y los nacidos vivos en el año.

$$TMF = \frac{\frac{Z}{D(f)}}{\frac{Z}{B}} \times 1000$$

- TASA DE MORTALIDAD FETAL TARDIA:

Relacion entre las defunciones con 28 semanas y mas de gestacion en un año dado y los nacidos vivos del año.

$$TMFT = \frac{\frac{Z}{D(28 \text{ SEMANAS Y MAS})}}{\frac{Z}{B}} \times 1000$$

- TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:

Relacion entre las defunciones de niños menores de 1 año, en un año dado y los nacidos vivos del año.

$$TMI = \frac{\frac{Z}{D(1 \text{ año})}}{\frac{Z}{B}} \times 1000$$

- TASA DE MORTALIDAD NEONATAL:

Relacion entre las defunciones de niños menores de 28 días en un año dado y los nacidos vivos del año.

- TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL:

Relacion entre las defunciones de niños con edades comprendidas entre 28 días y menos de 1 año, un año dado y los nacidos vivos del año.

- TASA DE NUPTIALIDAD POR EDAD Y SEXO:

Relacion entre las personas de un determinado grupo de edad y sexo que han contraído matrimonio en un año dado y la población de ese grupo de edad y ese sexo en el mismo periodo.

$$TN(x,5) = \frac{\sum_z M(x,5)}{\sum_z N(x,5)} \times 1000$$

- TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD POR EDAD:

Relacion entre los fallecidos de un determinado grupo de edades durante un periodo determinado y la población media de ese grupo de edades en el mismo periodo.

$$TM(x,5) = \frac{\sum_z D(x,5)}{\sum_{30-vi-z} N(x,5)} \times 1000$$

- TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD POR SEXO:

Relacion entre los fallecidos de un determinado sexo durante un periodo determinado y la población media de ese sexo en el mismo periodo.

$$TM_s = \frac{\sum_z D_s}{\sum_{30-vi-z} N_s} \times 1000$$

- TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD:

Numero de hijos que en promedio tendria cada mujer de una cohorte hipotetica de mujeres que durante el periodo fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y que no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el termino del periodo fértil. Se obtiene por suma de las tasas de fecundidad por edad.

$$TGF = 5 \sum_{x=15}^{45} F(x,5)$$

N : Poblacion total.

NM : Poblacion masculina.

NF : Poblacion femenina.

D : Defunciones.

B : Nacimientos.

K : Proporción de nacimientos femeninos.

M : Matrimonios.

z : Año en estudio.

(x,5): Periodo quinquenal a partir de la edad x.

- 010 Cólera
- 011 Fiebre tifoidea
- 012 Shigelosis
- 013 Intoxicación alimentaria
- 014 Amibiasis
- 015 Infecciones intestinales debidas a otros
organismos especificados
- 016 Infección intestinal mal definida
- 020 Tuberculosis pulmonar
- 021 Otras tuberculosis del aparato respiratorio
- 022 Tuberculosis de las meninges y del sistema
nervioso central
- 023 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de
los ganglios mesentéricos
- 024 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones
- 025 Tuberculosis del aparato genitourinario
- 030 Peste
- 031 Brucelosis
- 032 Lepra
- 033 Difteria
- 034 Tos ferina
- 035 Angina estreptocócica, escarlatina y erisipela
- 036 Infecciones meningocócicas
- 037 Tétanos
- 038 Septicemia
- 040 Poliomiелitis aguda
- 041 Viruela
- 042 Sarampión
- 043 Rubéola
- 044 Fiebre amarilla
- 045 Encefalitis transmitidas por artrópodos
- 046 Hepatitis vírica
- 047 Rabia
- 048 Tracoma
- 050 Tifus epidémico transmitido por piojos
- 051 Otras rickettsiosis
- 052 Paludismo
- 053 Leishmaniasis
- 054 Tripanosomiasis
- 060 Sífilis
- 061 Infecciones gonocócicas

- 070 Enfermedades no sifilíticas causadas por espiroquetas
- 071 Micosis
- 072 Esquistosomiasis
- 073 Equinococosis
- 074 Filariasis y dracontiasis
- 075 Anquilostomiasis y necatoriasis
- 076 Otras helmintiasis

- 077 Efectos tardíos de la tuberculosis
- 078 Efectos tardíos de la poliomiелitis aguda
- 089 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
- 090 Tumor maligno del esófago
- 091 Tumor maligno del estómago
- 092 Tumor maligno del intestino delgado
- 093 Tumor maligno del colon
- 094 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoidea y del ano
- 095 Tumor maligno del hígado, especificado como primario
- 096 Tumor maligno del páncreas

- 100 Tumor maligno de la laringe
- 101 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón
- 110 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares
- 111 Melanoma maligno de la piel
- 112 Otro tumor maligno de la piel
- 113 Tumor maligno de la mama de la mujer
- 120 Tumor maligno del cuello del útero
- 121 Tumor maligno de la placenta
- 122 Tumor maligno del cuerpo del útero y del útero, parte no especificada
- 123 Tumor maligno del ovario y otros anexos del útero
- 124 Tumor maligno de la próstata
- 125 Tumor maligno del testículo
- 126 Tumor maligno de la vejiga

- 130 Tumor maligno del encéfalo

- 140 Enfermedad de Hodgkin
- 141 Leucemia

- 150 Tumor benigno de la piel
- 151 Tumor benigno de la mama
- 152 Tumor benigno del útero
- 153 Tumor benigno del ovario
- 154 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios
- 155 Tumor benigno del sistema nervioso
- 156 Tumor benigno de la glándula tiroides
- 169 Carcinoma in situ
- 179 Otros tumores y los de naturaleza no especificada
- 180 Enfermedades de la glándula tiroides
- 181 Diabetes mellitus
- 182 Hiperlipoproteinemia
- 183 Obesidad de origen no endocrino
- 190 Kwashiorkor
- 191 Marasmo nutricional
- 192 Otra desnutrición proteinocalórica
- 193 Avitaminosis
- 200 Anemias
- 210 Psicosis orgánicas senil y presenil
- 211 Psicosis esquizofrénica
- 212 Psicosis afectivas
- 213 Otra psicosis
- 214 Trastornos neuróticos y de la personalidad
- 215 Síndrome de dependencia del alcohol
- 216 Dependencia de las drogas
- 217 Alteraciones de las funciones corporales originadas por trastornos mentales
- 218 Retraso mental
- 220 Meningitis
- 221 Enfermedad de Parkinson
- 222 Otros trastornos degenerativos y hereditarios del sistema nervioso central
- 223 Esclerosis en placas
- 224 Parálisis cerebral infantil y otros síndromes parálisis
- 225 Epilepsia
- 230 Glaucoma
- 231 Catarata
- 232 Ceguera y disminución de la agudeza visual
- 233 Conjuntivitis
- 234 Trastornos del aparato lagrimal
- 235 Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular

- 240 Otitis media y mastoiditis
- 241 Sordera
- 250 Fiebre reumática aguda
- 251 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón
- 260 Enfermedad cardíaca hipertensiva
- 270 Infarto agudo del miocardio
- 280 Embolia pulmonar
- 281 Disritmia cardíaca
- 290 Hemorragia subaracnoidea
- 291 Hemorragia intracerebral y otras hemorragias intracraneales
- 292 Infarto cerebral
- 293 Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida
- 294 Aterosclerosis cerebral
- 300 Aterosclerosis
- 301 Embolia y trombosis arteriales
- 302 Otras enfermedades de las arterias, las arteriolas y los vasos capilares
- 303 Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis venosas
- 304 Várices de los miembros inferiores
- 305 Hemorroides
- 310 Amigdalitis aguda
- 311 Laringitis y traqueitis agudas
- 312 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
- 313 Desviación del tabique nasal y pólipos nasales
- 314 Faringitis, rinofaringitis y sinusitis crónicas
- 315 Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoides
- 320 Bronquitis y bronquiolitis agudas
- 321 Neumonía
- 322 Influenza
- 323 Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma
- 324 Bronquiectasia
- 325 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- 326 Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares debidas a agentes externos
- 327 Pleuresía

- 330 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén
- 331 Enfermedades de los maxilares
- 340 Enfermedades del esófago
- 341 Ulceras gástrica y duodenal
- 342 Apendicitis
- 343 Hernia de la cavidad abdominal
- 344 Obstrucción intestinal sin mención de hernia
- 345 Divertículo del intestino
- 346 Otros trastornos digestivos funcionales
- 347 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado
- 348 Colelitiasis y colecistitis
- 350 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis
- 351 Infecciones renales
- 352 Cálculo urinario
- 353 Cistitis
- 360 Hiperplasia de la próstata
- 361 Hidrocele
- 362 Elongación excesiva del prepucio y fimosis
- 363 Esterilidad del varón
- 370 Enfermedades de la mama
- 371 Salpingitis y ooforitis
- 372 Enfermedades inflamatorias del tejido celular pelviano y del peritoneo
- 373 Enfermedades inflamatorias del útero, de la vagina y de la vulva
- 374 Prolapso uterovaginal
- 375 Trastornos de la menstruación
- 376 Esterilidad de la mujer
- 380 Aborto espontáneo
- 381 Aborto inducido legalmente
- 382 Aborto inducido ilegalmente
- 390 Hemorragia del embarazo y del parto
- 391 Toxemia del embarazo
- 392 Infecciones del aparato genitourinario en el embarazo
- 393 Parto obstruido
- 394 Complicaciones del puerperio

- 409 Causas obstétricas indirectas
- 419 Parto normal
- 420 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo
- 430 Artritis reumatoide, excepto la de la columna vertebral
- 431 Otras artropatías
- 432 Otros trastornos de las articulaciones
- 433 Espondilitis anquilosante
- 434 Otras dorsopatías
- 435 Reumatismo, con exclusión del dorso
- 436 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos
- 437 Deformidades adquiridas de los miembros
- 440 Espina bífida e hidrocefalia
- 441 Otras deformidades del sistema nervioso central
- 442 Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio
- 443 Fisura del paladar y labio leporino
- 444 Otras deformidades del aparato digestivo
- 445 Testículo no descendido
- 446 Luxación congénita de la cadera
- 447 Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular
- 450 Enfermedades de la madre que afectan al feto o al recién nacido
- 451 Complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido
- 452 Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal
- 453 Traumatismo del nacimiento
- 454 Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido
- 455 Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido
- 456 Tetanos Neonatal

- 460 Pirexia de origen desconocido
- 461 Síntomas cardíacos
- 462 Cólico renal
- 463 Retención de orina
- 464 Dolor abdominal
- 465 Senilidad sin mención de psicosis
- 466 Síndrome de la muerte súbita del lactante
- 467 Falla respiratoria
- E470 Accidentes de ferrocarril
- E471 Accidentes de tráfico de vehículos de motor
- E472 Accidentes de otros vehículos de carretera
- E473 Accidentes de transporte acuático
- E474 Accidentes del transporte aéreo y espacial
- E480 Envenenamiento accidental por drogas, medicamentos y productos biológicos
- E481 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas
- E482 Envenenamiento accidental por gases y vapores
- E499 Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores
- E509 Caídas accidentales
- E519 Accidentes causados por el fuego
- E520 Accidentes debidos a factores naturales y del ambiente
- E521 Ahogamiento y sumersión accidentales
- E522 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por un orificio natural
- E523 Accidente causado por maquinaria y por instrumentos cortantes o punzantes
- E524 Accidente causado por proyectil de arma de fuego
- E539 Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico
- E549 Suicidio y lesiones autoinfligidas
- E559 Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona
- E560 Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas
- E561 Lesiones resultantes de operaciones de guerra

AGRUPACION DE LAS CAUSAS DE MUERTE (C.I.E. 9MA. REVISION) DE MENORES DE
1 AÑO, BASADA EN LA APLICACION DE CRITERIOS DE EVITABILIDAD.

DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DIAS)

REDUCIBLES POR BUEN CONTROL DEL EMBARAZO.

SIFILIS CONGENITA (090)
ENFERMEDADES DE LA MADRE (760)
ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO (773)
TETANOS (037)

REDUCIBLES POR BUENA ATENCION DEL PARTO

FETO O RECIEN NACIDO AFECTADO POR COMPLICACIONES DE LA PLACENTA, DEL CORDON
UMBILICAL O DE LAS MEMBRANAS (762)
FETO O RECIEN NACIDO AFECTADO POR OTRAS COMPLICACIONES DEL TRABAJO Y DEL PARTO (763)
TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION PROLONGADA DE LA GESTACION Y CON EL PESO
ELEVADO AL NACER (766)
TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO (767)
HIPOXIA UTERINA Y ASFIXIA AL NACER (768)
INFECCIONES PROPIAS DEL PERIODO PERINATAL (771)

REDUCIBLES POR DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (520)
OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO (770)
HEMORRAGIA FETAL Y NEONATAL (772)
OTRAS FORMAS DE ICTERICIA PERINATAL (774)
TRASTORNOS PERINATALES DEL APARATO DIGESTIVO (777)
OTRAS REDUCIBLES POR DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ (680-709;775;776;778)

REDUCIBLES POR BUENAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y TRASTORNOS HIDROSALINOS (001-009;276)

OTRAS REDUCIBLES

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (460-519)

ACCIDENTES, CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS (E800-E999)

PARCIALMENTE REDUCIBLES

DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION (260-269)

CRECIMIENTO FETAL LENTO Y DESNUTRICION FETAL (764)

DURACION CORTA DE LA GESTACION Y BAJO PESO AL NACER (765)

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA (769)

NO EVITABLES

TUMORES (140-239)

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (390-459)

ANOMALIAS CONGENITAS (740-759)

DESCONOCIDAS

OTRAS AFECCIONES Y LAS MAS DEFINIDAS QUE SE ORIGINAN EN EL PERIODO PERINATAL (779)

SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS (780-796;799)

SINDROME DE LA MUERTE SUBITA DEL LACTANTE (798)

OTRAS CAUSAS

RESTO DE LAS CAUSAS.

DEFUNCIONES POST-NEONATALES (DE 28 DIAS A 11 MESES)
-----REDUCIBLES POR PREVENCIÓN

DIFTERIA (032)
TOS FERINA (033)
SARAMPION (055)
SIFILIS CONGENITA (090)

REDUCIBLES POR DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ

SEPTICEMIA (038)
MENINGITIS (036; 320)
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (520-579)
ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (580-629)
OTRAS REDUCIBLES POR DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ (345; 380-384; 680-709)

REDUCIBLES POR BUENAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO

DIARREAS Y HEPATITIS (001-009; 070)
TRASTORNOS ELECTROLITICOS (276)

OTRAS REDUCIBLES

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (460-519)
ACCIDENTES, CAUSAS EXTERNAS Y TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS (E800-E999)

PARCIALMENTE REDUCIBLES

DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION (260-269)
CRECIMIENTO FETAL LENTO Y DESNUTRICION FETAL (764)
DURACION CORTA DE LA GESTACION Y BAJO PESO AL NACER (765)

NO EVITABLES

VARICELA (052)
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (390-459)
ANOMALIAS CONGENITAS (740-759)
OTRAS NO EVITABLES (254; 255; 258; 259; 343)


DESCONOCIDAS

OTRAS AFECCIONES Y DEFICIENCIAS POR CAUSAS DESCONOCIDAS (779)
SINTOMAS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS (780-796; 799)
MUERTE SUBITA (798)

OTRAS CAUSAS

RESTO DE LAS CAUSAS

FUENTE: AGRUPAMIENTO CAUSAS DE MUERTE EN BASE A CRITERIOS DE
EVITABILIDAD PROPUESTOS POR LA DRA. ERIKA TAUCHER,
CONSULTORA DE O.P.S. (O.M.S.).



Area Metropolitana